Loción - Shampoo

Venta Libre - Industria Argentina

nopucid® COMPUESTO

Deltametrina
Piperonil Butóxido

Fórmulas:

Loción: deltametrina 0,020 g; piperonil butóxido 0,100 g. Exc.: formol 37 % 0,525 g; acetona 0,791 g; ciclohexanona 0,497 g; perfume colonia manzanas verdes 0,508 g; butilhidroxitolueno 0,0085 g; colorante verde 735 0,15 mg (compuesto por tartrazina; azul brillante); alcohol etílico 96° 0,806 g; arkopal N° 100 5,80 g; ácido clorhídrico pH 5,0-5,5; agua desmineralizada c.s.p.100 ml. **Shampoo:** deltametrina 0,020 g; piperonil butóxido 0,100 g. Exc.: ácido clorhídrico c.s.p. pH 5,0-5,5; formaldehido 37 % 0,54 g; acetona 0,791 g; ciclohexanona 0,497 g; cloruro de sodio 2,00 g; dietanolamida de ácidos grasos de coco 1,00 g; perfume colonia de manzanas verdes 0,50 g; butilhidroxitolueno 0,0085 g; colorante verde 735 0,35 mg (compuesto por tartrazina; azul brillante); lauril éter sulfato de sodio 19,00 g; alcohol etílico 96° 0,806 g; arkopal N°100 5,60 g; agua desmineralizada c.s.p. 100 ml.

Indicaciones:






Ectoparasiticida de uso externo para el tratamiento de la pediculosis del cuero cabelludo.

Acción terapéutica:

Pediculicida. Actúa sobre los piojos y las liendres más expuestas.

Modo de empleo:

Se recomienda el siguiente esquema:

Día 1 **Noche**	 1	• Aplicar **Nopucid compuesto** ***loción*** mediante masaje firme, con el objeto de impregnar el cabello y el cuero cabelludo. Dejar actuar la ***loción*** durante **toda la noche**, sin enjuagar.
Día 2 **Mañana**	 2	• Al día siguiente, por la mañana lavar el cabello con **Nopucid compuesto** *shampoo.*
	 3	• Dejar actuar **Nopucid compuesto** *shampoo* durante 10 minutos.
	 4	• Enjuagar el cabello (puede emplear una crema enjuague).
	 5	• Con el cabello aún húmedo, pasar el peine extrafino para facilitar el arrastre de los huevos o liendres. El peinado debe efectuarse desde la raíz a la punta del cabello.
Día 2 **Noche**	6	• Repetir el tratamiento del **Día 1 Noche**
Día 3 **Mañana**	7	• a) Repetir el tratamiento del **Día 2 Mañana** b) En los días subsiguientes se aconseja examinar minuciosamente la cabeza del paciente infestado. Una sola aplicación suele ser efectiva, sin embargo, en caso de detectar la presencia de piojos vivos y/o liendres, repetir el tratamiento a los 7 ó 14 días de la primera aplicación.

Medidas complementarias

Los piojos o sus huevos no sólo están en la cabeza, sino que también los podemos hallar por períodos cortos (2 a 3 días) en diversos lugares de alto riesgo epidémico (escuelas, clubes, piletas de natación, areneros, colonias de vacaciones, etc.) e incluso en objetos de uso personal y ropas que están en contacto con el infestado.

Efectos secundarios:

En individuos sensibles puede observarse irritación, prurito (picazón), ardor, eritema (enrojecimiento de la piel) a nivel de cuero cabelludo. Dificultad respiratoria o crisis asmática en personas predispuestas. No se ha descripto que la aplicación tópica (en la cabeza) de **Nopucid compuesto** ***loción y/o shampoo*** produzca efectos secundarios en el organismo.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula. Embarazo. Lactancia. Menores de 2 años.

Precauciones y advertencias:

- El *shampoo* y la *loción* **Nopucid compuesto** son de **USO TÓPICO EXTERNO** (en la cabeza) exclusivo.
- **Evitar el contacto con los ojos, mucosas (labios), heridas y quemaduras.** En caso de producirse el contacto accidental del producto con los ojos, mucosas, heridas o quemaduras, lavar con abundante agua fría. Consultar al médico si persiste la irritación.
- Si hubiere infección o lesiones a nivel del cuero cabelludo, consultar al médico antes de utilizar el producto. Debe tenerse en cuenta que en la pediculosis son frecuentes las lesiones por rascado.
- Recordar que es conveniente utilizar este producto en lugares bien ventilados.
- **No debe ingerirse.** En caso de ingestión accidental del producto, consultar al médico, hospital o Centro de Toxicología más cercano. (Adjunto a este producto encontrará información vinculada con centros toxicológicos).

Información para el paciente:

Las liendres (huevos) suelen ser más visibles cerca del cuello y detrás de las orejas, pero pueden encontrarse en cualquier parte de la cabeza. Todas las prendas en contacto con el paciente deben ser bien lavadas con agua bien caliente ó en lavarropas durante 20 minutos. Las que no puedan ser lavadas, dejar en bolsa plástica cerrada por 2 semanas. Debido a que ninguna piretrina es totalmente ovicida (no actúa sobre todas las liendres sino sobre las más expuestas) y a pesar de la actividad residual de las mismas, es necesario remover las liendres mecánicamente con un peine fino y en ocaciones repetir el tratamiento a los 7 ó 14 días del primero. Desinfectar peines y cepillos con agua hirviendo durante 5 minutos por lo menos. Evaluar al grupo de convivencia del paciente, ya que el tratamiento es más efectivo simultáneamente en todas las personas infestadas.

Ante cualquier duda consulte a su médico.

Presentaciones	Contenido
Nopucid Compuesto loción	100 ml
Nopucid Compuesto shampoo	100 ml

Otras presentaciones	Contenido
Nopucid Compuesto *aerosol*	130 ml
Nopucid 10 *crema acondicionadora*	100 g
Nopucid mc loción	100 ml

Importante: *Si usted compró sólo Nopucid Compuesto Loción, luego de aplicarlo puede lavar el cabello con su shampoo habitual. Y si lo prefiere, puede utilizar cualquier crema de enjuague.*
La loción permite intensificar el tratamiento gracias a sus componentes, Deltametrina y PBX, y a su mayor tiempo de exposición.
El Shampoo brinda control y suavidad. Además es ideal para complementar la acción de las otras presentaciones de Nopucid.

Conservar por debajo de 40 ºC (preferentemente entre 15 ºC y 30 ºC), en el envase bien cerrado. NO CONGELAR.
Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud - Cert. Nº 38.691
INTERBELLE COSMETICS S.A. - Calle Nº 3 esquina calle Nº 103.
Localidad Parque Industrial Norte, Provincia de San Luis.
Dir. Téc.: Mauricio Filippa, Farmacéutico.
Ultima revisión: Noviembre/1997 53924-00 1-pm-i